

CAT ENVISAGABLE DANS LE TRAITEMENT DE LA FA

FA persistante


Δ Patient avec critères AFIRM*, choix entre

√ Contrôle de fréquence

Nodofreinateurs*

Ablation de la JAV* si inefficacité des nodofreinateurs

√ CEE + AA* sans acharnement




⊕ AVK

Δ Patient sans critères AFFIRM

√ CEE + AA

√ Déconnection des VP* si inefficacité des AA et mauvaise tolérance



Cardiopathie


OUI : AVK

Non : Aspirine

FA paroxystique

√ AA sauf le premier accès

√ Déconnection des VP si inefficacité des AA et mauvaise tolérance



Cardiopathie


OUI : AVK

Non : Aspirine

FA Aiguë

Attendre la réduction spontanée sous traitement de la pathologie causale

Utilisation si besoin de nodofreinateurs



Couverture par AVK pendant 3 semaines

Critères AFFIRM : Age supérieur à 65 ans **ou** ayant 1 facteur de risque d'AVC : HTA, Diabète, Insuffisance cardiaque, ATCD d'AVC.

Nodofreinateur : Digitaliques, Inhibiteurs calciques. **JAV** : Jonction Auriculo-Ventriculaire. **AA** : AntiArythmiques. **VP** : Veines Pulmonaires.

Concertation Multidisciplinaires. CH Yves LE FOLL. St Brieuc. 2006